



◎オホーツクタワーの動物プランクトン分析速報(2019年1月)

海洋環境データ


◎水温 (0~9mまでの平均値)



◎塩分 (0~9mまでの平均値)



◎Chl. a (0~9mまでの平均値)




※観測：紋別市

動物プランクトンデータ

※分析：(株)エコニクス

◎動物プランクトン・沈殿量



概要

Table with columns for dates (1月5日, 1月15日, 1月23日) and rows for water temperature, salinity, Chl. a, sedimentation, and main species. Species listed include Calanus pacificus, Mesocalanus tenuicornis, Pseudocalanus minutus, etc.

出現量の多かった種類



※海洋環境データ欄の水温、塩分、Chl.aのグラフは、水深0~9mまでの平均値をプロットしたものである。平均水温、平均塩分、平均Chl.a欄の数値は、表示の都合上、水深0~9mまでの平均値を小数第2位で四捨五入した値で示し、グラフ上の表示と異なる場合がある。

※種名の先頭に“◎”がつく種類は、出現量の多い種類を示す。[]内の“+”は分析者の経験から、サンプル中の個体数の多さが後述の程度であると判断し、区分したグループである(+出現、++やや多い、+++多い、++++かなり多い、+++++極めて多い)。

※種名の後ろの記号は、分析者の経験から北海道における出現傾向に後述の特徴があると判断し、区分したグループである(◆冷水性種、◆暖水性種、◆汽水性種)。

※参考文献：

List of references including: ①千原・村野(1997)日本産海洋プランクトン検索図説, ②山路(1966)日本海洋プランクトン図鑑, ③岩国市立微生物館 監修(2011)日本の海産プランクトン図鑑, ④Wilson, M. S. (1966) North American Harpacticoid copepods, ⑤Pinchuk, A. I. & Hopcroft, R. R. (2006) Egg production and early development of Thysanoessa inermis and Euphausia pacifica, ⑥林(2006)水産無脊椎動物学入門, ⑦西・加藤(2002)日本産カムリゴカイ科多毛類の分類について, ⑧西・加藤(2002)日本産カムリゴカイ科多毛類の分類について, タクサ 13, 5-17, ⑨今島(1996)環形動物 多毛類(生物研究社), ⑩日本プランクトン学会 監修(2011)すかん プランクトン[技術評論社], ⑪水島・鳥澤 監修(2003)漁業生物図鑑 新 北のさかたな[北海道新聞社], ⑫古賀(1960)Centropages abdominalis SATOのノープリウス幼生, 日本水産学会誌 26(9), 877-881, ⑬伊藤・水島・久保田(2005)駿河湾三保沖におけるカラヌス目カイアシ類の季節的消長, 東海大学紀要海洋学部 3(1), 19-35, ⑭大越・野村(1990)穿孔性多毛類Polydora属による北海道地方, 東北地方沿岸のホタテ貝浸食状況, 日本水産学会誌 56(10), 1593-1598.