



◎オホーツクタワーの動物プランクトン分析速報 (2021年9月)

海洋環境データ


◎水温 (0~9mまでの平均値)



◎塩分 (0~9mまでの平均値)




◎Chl. a (0~9mまでの平均値)



※観測：紋別市

動物プランクトンデータ

◎動物プランクトン・沈殿量



※分析：(株)エコニクス

概要

	9月7日	9月18日	9月29日
平均水温 (°C)	20.2	19.1	18.6
平均塩分 (PSU)	33.9	33.8	34.0
平均Chl.a (µg/L)	1.0	1.7	1.2
沈殿量 (ml/m³)	(NORPACネット) 0.1 (北原式定量ネット) 15.1	(NORPACネット) 0.1 (北原式定量ネット) 7.1	(NORPACネット) 0.1 (北原式定量ネット) 8.7
主な出現種	<p>(NORPACネット)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎<i>Evadne spinifera</i> [++] ◎<i>Evadne tergestina</i> [++] <p>(北原式定量ネット)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎<i>Paracalanus parvus</i> s. 1. [+++] ◎<i>Eurytemora pacifica</i> [+ ◎<i>Pseudodiaptomus marinus</i> [+ ◎<i>Labidocera japonica</i> [+ ◎<i>Acartia hudsonica</i> [+ 	<p>(NORPACネット)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎<i>Paracalanus parvus</i> s. 1. [+ ◎<i>Eurytemora pacifica</i> [+ ◎<i>Centropages maigo</i> [+ <p>(北原式定量ネット)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎<i>Paracalanus parvus</i> s. 1. [+++] ◎<i>Eurytemora pacifica</i> [+ ◎<i>Centropages maigo</i> [+ ◎<i>Pseudodiaptomus marinus</i> [+ ◎<i>Acartia hudsonica</i> [+ 	<p>(NORPACネット)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎<i>Paracalanus parvus</i> s. 1. [+ ◎<i>Eurytemora pacifica</i> [+ ◎<i>Centropages maigo</i> [+ ◎<i>Pseudodiaptomus marinus</i> [+ <p>(北原式定量ネット)</p> <ul style="list-style-type: none"> ◎<i>Paracalanus parvus</i> s. 1. [+++] ◎<i>Eurytemora pacifica</i> [+ ◎<i>Centropages maigo</i> [+ ◎<i>Pseudodiaptomus marinus</i> [+
備考	(NORPACネット) - (北原式定量ネット) 腐植質・珪藻多い	(NORPACネット) - (北原式定量ネット) 腐植質・珪藻多い	(NORPACネット) - (北原式定量ネット) 腐植質・珪藻やや多い

出現量の多かった種類

- *Paracalanus parvus* s. 1. (北原式定量ネット)
- *Copepoda* (nauplius) (北原式定量ネット)
- *Acartia steueri* (北原式定量ネット)
- *Podon polyphemoides* (北原式定量ネット)
- *Oithona similis* (北原式定量ネット)
- *Evadne spinifera* (北原式定量ネット)
- *Microsetella norvegica* (北原式定量ネット)
- *Evadne tergestina* (北原式定量ネット)

※海洋環境データ欄の水温、塩分、Chl.aのグラフは、水深0~9mまでの平均値をプロットしたものである。平均水温、平均塩分、平均Chl.a欄の数値は、表示の都合上、水深0~9mまでの平均値を小数第2位で四捨五入した値で示し、グラフ上の表示と異なる場合がある。
 ※種名の先頭に“◎”がつく種類は、出現量の多い種類を示す。[]内の“+”は分析者の経験から、サンプル中の個体数の多さが後述の程度であると判断し、区分したグループである(+出現、++やや多い、+++多い、++++かなり多い、+++++極めて多い)。
 ※種名の後ろの記号は、分析者の経験から北海道における出現傾向に後述の特徴があると判断し、区分したグループである(◆冷水性種、◆暖水性種、■汽水性種)。
 ※今月のサンプルには珪藻類(植物プランクトンの仲間)、腐植質(主に枯死・分解した植物由来の物質)が多く含まれており、沈殿量の数値はこれを含む。
 ※参考文献：
 ①千原・村野(1997)日本産海洋プランクトン検索図説[東海大学出版会]②山路(1966)日本海洋プランクトン図鑑[保育社]③若市立ミクロ生物館 監修(2011)日本の海産プランクトン図鑑[共立出版]
 ④Wilson, M. S. (1966) North American Harpacticoid copepods, 8: The *Daniellsenia sibirica* group, with description of *D. stefanssoni* Willey from Alaska. *Pac. Sci.* **20** (4), 435-444.
 ⑤Pinchuk, A. I. & Hopcroft, R. R. (2006) Egg production and early development of *Thysanoessa inermis* and *Euphausia pacifica* (Crustacea: Euphausiacea) in the northern Gulf of Alaska. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* **332**, 206-215.
 ⑥林(2006)水産無脊椎動物学入門[恒里社]⑦Ohtsuka, S., H. Itoh & T. Mizushima. (2005) A new species of the calanoid copepod genus *Centropages* (Crustacea) collected from Shimizu Port, middle Japan: Introduced or not? *Plankton Biol. Ecol.* **52** (2), 92-99.
 ⑧西・加藤(2002)日本産カムリコカイ科多毛類の分類について. *タクサ*. **13**, 5-17.⑨今島(1996)環形動物 多毛類[生物研究社]⑩日本プランクトン学会 監修(2011)すかん プランクトン[技術評論社]⑪水島・鳥澤 監修(2003)漁業生物図鑑 新 北のさかなたち[北海道新聞社]
 ⑫古賀(1960) *Centropages abdominalis* SATOのノープリウス幼生. *日本水産学会誌*. **26** (9), 877-881.⑬伊藤・水島・久保田(2005)駿河湾三保沖におけるカラヌス目カイアシ類の季節的消長. *東海大学紀要海洋学部*. **3** (1), 19-35.
 ⑭大越・野村(1990)穿孔性多毛類 *Polychaeta* 属による北海道地方、東北地方沿岸のホタテ貝浸食状況. *日本水産学会誌*. **56** (10), 1593-1598.⑮峯水・久保田・平野・リンズィー(2015)日本クラゲ大図鑑[平凡社]⑯奥谷(2017)日本近海産貝類図鑑【第二版】[東海大学出版部]