



# ◎オホーツクタワーの動物プランクトン分析速報 (2023年8月)

## 海洋環境データ



## 動物プランクトンデータ



## 概要

	8月3日	8月17日	8月29日	
平均水温 (°C)	21.7	19.4	23.5	
平均塩分 (PSU)	33.4	32.6	32.9	
平均Chl.a (µg/L)	1.5	2.2	2.0	
沈殿量 (ml/m³)	(NORPACネット) 0.1 (北原式定量ネット) 11.3	(NORPACネット) 0.2 (北原式定量ネット) 3.0	(NORPACネット) 0.1 (北原式定量ネット) 0.5	
主な出現種	<p>(NORPACネット)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○<i>Mesocalanus tenuicornis</i> [+]◆ (イソ類：メソカルアノミダ [暖水性])</li> <li>○<i>Centropages abdominalis</i> [+] (イソ類：セントロパギス・アブドミナリス)</li> <li>◎<i>Paracalanus parvus</i> s. l. [++]◆ (イソ類：パカラン・パルス [暖水性])</li> <li>○<i>Tortanus discaudatus</i> [+]■ (イソ類：トルタン・ディスカウダタス [汽水性])</li> <li>◎<i>Microsetella norvegica</i> [+++]◆ (イソ類：ミクロセタラ・ノルヴェギカ [暖水性])</li> <li>○Spionidae (larva) [+] (多毛類：スピオニダ科の幼生)</li> </ul> <p>(北原式定量ネット)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎<i>Paracalanus parvus</i> s. l. [++]◆ (イソ類：パカラン・パルス [暖水性])</li> <li>◎<i>Microsetella norvegica</i> [++++]◆ (イソ類：ミクロセタラ・ノルヴェギカ [暖水性])</li> <li>◎Copepoda (nauplius) [++] (イソ類のノブノブ幼生)</li> <li>○Bivalvia (larva) [+] (二枚貝類の幼生)</li> </ul>	<p>(NORPACネット)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎<i>Evadne spinifera</i> [++]◆ (枝角類：エヴァドネ・スピニフェラ [暖水性])</li> <li>○<i>Podon polyphemoides</i> [+]◆ (枝角類：ポドン・ポリフェモイドス [暖水性])</li> <li>◎<i>Pseudevadne tergestina</i> [++]◆ (枝角類：プセウヴァドネ・テグステイナ [暖水性])</li> <li>◎Crangonidae (zoea) [++] (イシエビ類：クワンガノイダ科のゾエ)</li> <li>○Ophiuroidea (ophiopluteus) [+] (イシエビ類：オフィウロイデア科のゾエ)</li> <li>○<i>Engraulis japonicus</i> (egg) [+]◆ (イシエビ類：エングラウリス・ジャポニクス [暖水性])</li> </ul> <p>(北原式定量ネット)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○<i>Limacina</i> sp. [+] (巻貝類：リマシナ科)</li> <li>◎<i>Podon polyphemoides</i> [++]◆ (枝角類：ポドン・ポリフェモイドス [暖水性])</li> </ul>	<p>(NORPACネット)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○<i>Acartia hudsonica</i> [+]■ (イソ類：アカルティア・ハドソンイカ [汽水性])</li> <li>○<i>Acartia steueri</i> [+]◆ (イソ類：アカルティア・シュタイア [暖水性])</li> <li>○<i>Calanus pacificus</i> [+]◆ (イソ類：カラン・パシフィック [暖水性])</li> <li>○<i>Centropages abdominalis</i> [+] (イソ類：セントロパギス・アブドミナリス)</li> <li>○<i>Clausocalanus peterseni</i> [+]◆ (イソ類：クラウソカルアヌ・ペテレンシ [暖水性])</li> <li>○<i>Labidocera japonica</i> [+]◆ (イソ類：ラビドセラ・ジャポニカ [暖水性])</li> <li>○<i>Pseudodiaptomus marinus</i> [+]■ (イソ類：シュウドテイアトマ・マリヌス [汽水性])</li> <li>○<i>Eurytemora herdmanni</i> [+]◆ (イソ類：ユリテモラ・ヘルドマン [冷水性/汽水性])</li> <li>○<i>Oithona similis</i> [+] (イソ類：オイトナ・シミリス)</li> <li>○Grapsidae (zoea) [+] (イソ類：グラプシダ科のゾエ)</li> <li>◎<i>Pinnixa</i> spp. (zoea) [+++] (イソ類：ピニキア科のゾエ)</li> <li>○Ophiuroidea (ophiopluteus) [+] (イソ類：オフィウロイデア科のゾエ)</li> </ul> <p>(北原式定量ネット)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○Gastropoda (larva) [+] (巻貝類の幼生)</li> <li>○Spionidae (larva) [+] (多毛類：スピオニダ科の幼生)</li> <li>○<i>Podon polyphemoides</i> [+]◆ (枝角類：ポドン・ポリフェモイドス [暖水性])</li> </ul>	<p>(NORPACネット)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○<i>Acartia hudsonica</i> [+]■ (イソ類：アカルティア・ハドソンイカ [汽水性])</li> <li>◎<i>Acartia steueri</i> [++++]◆ (イソ類：アカルティア・シュタイア [暖水性])</li> <li>○<i>Centropages abdominalis</i> [+] (イソ類：セントロパギス・アブドミナリス)</li> <li>○<i>Pinnixa</i> spp. (zoea) [+] (イソ類：ピニキア科のゾエ)</li> </ul> <p>(北原式定量ネット)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◎<i>Acartia steueri</i> [++]◆ (イソ類：アカルティア・シュタイア [暖水性])</li> <li>◎<i>Paracalanus parvus</i> s. l. [++]◆ (イソ類：パカラン・パルス [暖水性])</li> <li>○<i>Pseudodiaptomus marinus</i> [+]■ (イソ類：シュウドテイアトマ・マリヌス [汽水性])</li> <li>○<i>Oithona similis</i> [+] (イソ類：オイトナ・シミリス)</li> <li>◎<i>Microsetella norvegica</i> [++]◆ (イソ類：ミクロセタラ・ノルヴェギカ [暖水性])</li> </ul>
備考	(NORPACネット) — (北原式定量ネット) 珪藻やや多い	(NORPACネット) — (北原式定量ネット) 珪藻・腐植質やや多い	(NORPACネット) — (北原式定量ネット) 腐植質やや多い	

## 出現量の多かった種類



※海洋環境データ欄の水温、塩分、Chl.aのグラフは、水深0~9mまでの平均値をプロットしたものである。平均水温、平均塩分、平均Chl.a欄の数値は、表示の都合上、水深0~9mまでの平均値を小数第2位で四捨五入した値で示し、グラフ上の表示と異なる場合がある。

※種名の先頭に“◎”がつく種類は、出現量の多い種類を示す。[]内の“+”はサンプル中の個体数の多さが後述の程度であること判断し、区分したグループである[+]出現、[++]やや多い、[+++]多い、[++++]かなり多い、[+++++]極めて多い。

※種名の後ろの記号は、分析者の経験から北海道における出現傾向に後述の特徴があると判断し、区分したグループである◆冷水性種、◆暖水性種、■汽水性種。

※今月のサンプルには珪藻類(植物プランクトンの仲間)、腐植質(主に枯死・分解した植物由来の物質)が多く含まれており、沈殿量の数値はこれを含む。

※参考文献：  
 ①千原・村野 (1997) 日本産海洋プランクトン検索図説(東海大学出版会) / ②山路 (1966) 日本海洋プランクトン図鑑(保育社) / ③岩国市立ミクロ生物館 監修 (2011) 日本の海産プランクトン図鑑(共立出版)  
 ④Wilson, M. S. (1966) North American Harpacticoid copepods. 8: The *Daniellsenia sibirica* group, with description of *D. stefanssoni* Willey from Alaska. *Pac. Sci.* **20** (4), 435-444.  
 ⑤Pinchuk, A. I. & Hopcroft, R. R. (2006) Egg production and early development of *Thysanoessa inermis* and *Euphausia pacifica* (Crustacea: Euphausiacea) in the northern Gulf of Alaska. *J. Exp. Mar. Biol. Ecol.* **332**, 206-215.  
 ⑥林 (2006) 水産無脊椎動物学入門(恒里社学生館) / ⑦Ohtsuka, S., Itoh, H. & Mizushima, T. (2005) A new species of the calanoid copepod genus *Centropages* (Crustacea) collected from Shimizu Port, middle Japan: Introduced or not? *Plankton Biol. Ecol.* **52** (2), 92-99.  
 ⑧西・加藤 (2002) 日本産カムリゴカイ科多毛類の分類について. *タクサ*. **13**, 5-17. / ⑨今島 (1996) 環形動物 多毛類[生物研究社] / ⑩日本プランクトン学会 監修 (2011) すかん プランクトン[技術評論社] / ⑪水島・鳥澤 監修 (2003) 漁業生物図鑑 新北のさかなたち[北海道新聞社]  
 ⑫古賀 (1960) *Centropages abdominalis* SATOのノープリウス幼生. *日本水産学会誌*. **26** (9), 877-881. / ⑬伊藤・水島・久保田 (2005) 駿河湾三保沖におけるカラヌス目カイアシ類の季節的消長. *東海大学紀要海洋学部*. **3** (1), 19-35.  
 ⑭大越・野村 (1990) 穿孔性多毛類*Polydora*属による北海道地方、東北地方沿岸のホタテ貝浸食状況. *日本水産学会誌*. **56** (10), 1593-1598. / ⑮斎水・久保田・平野・リンズィー (2015) 日本クラゲ大図鑑(平凡社) / ⑯奥谷 (2017) 日本近海産貝類図鑑【第二版】[東海大学出版部]  
 ⑰大塚・上田・岩淵・伊東・徐・坂口・平野・木村・上野 (2007) 移入種か、在来種か? : 清水港から記載された浮遊性カイアシ類の1種の導入の可能性を検証する. *日本プランクトン学会報*. **54** (1), 30-38.